

Ejemplo #1

The Pharmacy America Trusts

2931 S RD PH
WI 53711 DR A.

NO DATE 03/06/03

MADISON, WI 53713

ONE TABLET UNDER TONGUE AS NEEDED FOR CHEST PAIN, MAY REPEAT EVERY 5 MINUTES UP TO THREE TIMES

NITROQUICK 0.4MG SUBL TABS 25'S

QTY 25 MFG ETHEX
NO REFILLS - DR. AUTHORIZATION REQUIRED

USE BEFORE Mfg. Labeled Date
DWJ/DWJ

BARREL SHAPED WHITE TABLET

Puede Causar Vértigo

Tomar Esta Medicina Solo O Con Alcohol Puede Dañar Su Capacidad Para Manejar O Realizar Tareas Peligrosas.

El Envase No Es A Prueba De Niños.

Disuelva Debajo De La Lengua O En La Boca Según Se Indique. No Mastique O Trague Entera.

Mantenga Esta Medicina En Su Envase Original Y Cierrelo Herméticamente Después De Cada Uso Para Prevenir La Pérdida De Potencia.

Your Personal Prescription Information


PATIENT

MEDICATION NITROQUICK 0.4MG SUBL TABS 25'S

QUANTITY 25

DIRECTIONS ONE TABLET UNDER TONGUE AS NEEDED FOR CHEST PAIN, MAY REPEAT EVERY 5 MINUTES UP TO THREE TIMES

NDC 58177-0324-18



PHARMACY PH (608)

DR .

Our records show that you have the following allergies:
PENICILLINS

Please tell us about any health conditions you have:

NOMBRE De INGREDIENTE:
NITROGLYCERIN (nye-troe-GLI-ser-in)

USOS COMUNES:
Esta medicina se usa para la prevención y el tratamiento de la angina o dolor en el pecho. La misma también se puede usar para el tratamiento de otras condiciones, según sea determinado por su médico.

COMO USAR ESTA MEDICINA:
Siga las instrucciones provistas por su médico para el uso de esta medicina. NO COMA O BEBA nada mientras esté usando esta medicina. USELA CUANDO ESTE SENTADO. A LA PRIMERA SEÑAL DE UN ATAQUE DE ANGINA, coloque 1 tableta debajo de la lengua. Déjela disolverse completamente. No mastique o trague la tableta. Repita cada 5 minutos hasta obtener alivio. No use más de 3 tabletas en 15 minutos. SI USTED TODAVIA SIENTE DOLOR después de haber usado 3 tabletas, póngase en contacto con su médico o vaya a la sala de emergencia del hospital. MANTENGA ESTA MEDICINA EN SU ENVASE ORIGINAL, cerrado con la tapa bien ajustada.

PRECAUCIONES:
ESTA MEDICINA PUEDE CAUSAR vértigo. Beber alcohol empeorará este efecto. No maneje vehículos, opere maquinarias o haga cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa hasta que usted no sepa cuál es su reacción a esta medicina. Si sufriera de mareo, siéntese o póngase de pie lentamente. ESTA MEDICINA PUDIERA DARLE dolor de cabeza o causarle una sensación de ardor u hormigueo en la boca. Estos efectos son normales. PARA HOMBRES: NO TOME VIAGRA (sildenafil) mientras esté usando esta medicina. PARA MUJERES: SI USTED PLANEA QUEDARSE EMBARAZADA, consulte con su médico los beneficios y los riesgos de usar esta medicina durante el embarazo. SE DESCONOCE SI ESTA MEDICINA SE EXCRETA en la leche materna. SI USTED ESTA O VA A ESTAR DANDO DE LACTAR mientras esté usando esta medicina, consulte con su médico o farmacéutico para discutir los riesgos para su bebé.

EFFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES:
LOS EFECTOS SECUNDARIOS, que pudieran desaparecer durante el tratamiento, incluyen vértigo, desvanecimiento de la cabeza o desmayo al sentarse o ponerse de pie; dolor de cabeza; ardor u hormigueo en la boca; un ritmo rápido de los latidos del corazón; o sonrojo de la cara y el cuello. Si los mismos persisten o son muy molestos, consulte con su médico. CONSULTE CON SU MEDICO INMEDIATAMENTE si experimenta dolor continuo en el pecho; dolor en el cuello, brazo o mandíbula; secreción excesiva de sudor o vómitos. Si usted notara otros efectos que no se hayan mencionado más arriba, póngase en contacto con su médico, enfermera o farmacéutico.

For faster service, phone in your refill request 24 hours in advance

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - STORE IN SAFETY CONTAINERS OR SECURE AREA

Nos Enfocamos En Ser Farmacia.

Nos Enfocamos En La Calidad Existente. Si Necesita Reordenar su Receta:

1. TOUCH-TONE: Llame a nuestro Sistema Telefonica Automatico.
2. ON-LINE: En el Internet vaya a www.touch-tone.com
3. AUTO-PREFILL: Pregunte a su Farmaceutico como puede resurtir su receta automaticamente.

PHARMACY

752 RD
MADISON, WI 53717
(608) 4500PRESCRIPTION
INFORMATION

3-03-03

NITROGLYCERIN 0.4MG TABLET

#25

NOMBRE GENERICO: NITROGLYCERIN (nye-troe-GLI-ser-in)

USOS COMUNES: Esta medicina se usa para la prevención y el tratamiento de la angina o dolor en el pecho. La misma también se puede usar para el tratamiento de otras condiciones, según sea determinado por su médico.

COMO USAR ESTA MEDICINA: Siga las instrucciones provistas por su médico para el uso de esta medicina. NO COMA O BEBA nada mientras está usando esta medicina. USELA CUANDO ESTE SENTADO. A LA PRIMERA SEÑAL DE UN ATAQUE DE ANGINA, coloque 1 tableta debajo de la lengua. Déjala disolverse completamente. No mastique o trague la tableta. Repita cada 5 minutos hasta obtener alivio. No use más de 3 tabletas en 15 minutos. SI USTED TODAVIA SIENTE DOLOR después de haber usado 3 tabletas, pángase en contacto con su médico o vaya a la sala de emergencia del hospital. MANTENGA ESTA MEDICINA EN SU ENVASE ORIGINAL, cerrado con la tapa bien ajustada.

PRECAUCIONES: ESTA MEDICINA PUEDE CAUSAR vértigo. Beber alcohol empeora este efecto. No maneje vehículos, opere maquinarias o haga cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa hasta que usted no sepa cuál es su reacción a esta medicina. Si sufre mareo, síntesis o pángase de pie lentamente. ESTA MEDICINA PUDIERA DARLE dolor de cabeza o causarle una sensación de ardor u hormigueo en la boca. Estos efectos son normales. PARA HOMBRES: NO TOME VIAGRA (sildenafil) mientras está usando esta medicina. PARA MUJERES: SI USTED PLANEA QUEDARSE EMBARAZADA, consulte con su médico los beneficios y los riesgos de usar esta medicina durante el embarazo. SE DESCONOCE SI ESTA MEDICINA SE EXCRETA en la leche materna. SI USTED ESTA O VA A ESTAR DANDO DE LACTAR mientras está usando esta medicina, consulte con su médico o farmacéutico para discutir los riesgos para su bebé.

EFFECTOS SECUNDARIOS POSIBLES: LOS EFFECTOS SECUNDARIOS, que pudieran desaparecer durante el tratamiento, incluyen vértigo, desvanecimiento de la cabeza o desmayo al sentarse o ponerse de pie; dolor de cabeza; ardor u hormigueo en la boca; un ritmo rápido de los latidos del corazón; o sonrojo de la cara y el cuello. Si los mismos persisten o son muy molestos, consulte con su médico. CONSULTE CON SU MEDICO INMEDIATAMENTE si experimenta dolor continuo en el pecho; dolor en el cuello, brazo o mandíbula; secreción excesiva de sudor o vómitos. Si usted notara otros efectos que no se hayan mencionado más arriba, pángase en contacto con su médico, enfermera o farmacéutico.

ANTES DE USAR ESTA MEDICINA: INFORMELE A SU MEDICO O FARMACEUTICO acerca de todas las medicinas recetadas y no recetadas que usted está tomando. Infórmele a su médico acerca de cualquier otro trastorno de importancia médica, alergias, embarazo o lactancia.

SOBREDOSIS: SI USTED O ALGUIEN QUE USTED CONOCE pudo haber usado más de la dosis recomendada de esta medicina, pángase en contacto con el centro de control de intoxicaciones en su área o acuda a una sala de emergencia de inmediato.

INFORMACION ADICIONAL: NO COMPARTA ESTA MEDICINA con otras personas para las cuales no ha sido prescrita. NO USE ESTA MEDICINA para otros trastornos de salud. MANTENGA ESTA MEDICINA lejos del alcance de los niños.

El propósito de la información en esta monografía no es el cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, acciones recíprocas entre drogas, o efectos adversos. Esta información es generalizada y no debe considerarse como consejo médico específico. Si usted tiene alguna pregunta o preguntas sobre las medicinas que está tomando o si requiere más información al respecto, por favor consulte con su médico, farmacéutico o enfermera.

Copyright 2003 Facts and Comparisons
Expires April, 2003

ORDER YOUR REFILL ONLINE AT WWW.DEANCARE.COM

PHARMACY

752 N RD
MADISON, WI 53717
(608) 4500

DISUELVA 1 TAB DEBAJO DE LA LENGUA CUANDO SEA NEC. PARA DOLOR EN PECHO. PUEDE REP. 2X, ESPERE 5MIN ENTRE DOSIS

NITROGLYCERIN 0.4MG TABLET

#25

AIRE LABS

NSC N DR

Pharmacy Services

608- 7688 Y
7102 ROAD
MADISON, WI 53717

Rx: Dr. 03/29/03

PLACE 1 TABLET UNDER TONGUE
EVERY 5 MINUTES AS NEEDED
FOR ANGINA. (REPEAT UP TO 3
TIMES AS NEEDED)

NITROTAB SL TABLET 0.4MG TAB

NDC# 53265-0250-04 ANIC Qty: 25

0 Refill(s) Refills Expire: 03/29/03
white, round, tablet; IMPRINT: 2



Caution: Federal Law
prohibits transfer of this drug
to any person other than
patient for whom prescribed.



MAY CAUSE
DROWSINESS OR
DIZZINESS



DO NOT DRINK
ALCOHOLIC BEVERAGES
WHEN TAKING THIS MEDICATION.



DISSOLVE UNDER THE TONGUE OR IN THE
MOUTH AS DIRECTED BY YOUR DOCTOR.
DO NOT CHEW
OR SWALLOW WHOLE.



IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU
TAKE OR USE THIS EXACTLY AS
DIRECTED. DO NOT SKIP DOSES
OR DISCONTINUE UNLESS
DIRECTED BY YOUR DOCTOR.



WARNING

TO PREVENT LOSS OF POTENCY,
KEEP THESE TABLETS IN ORIGINAL CONTAINER
CLOSE TIGHTLY IMMEDIATELY AFTER EACH USE.

NITROTAB SL TABLET 0.4MG TAB

Pharmacy Services

NOTE: The following information is intended to supplement, not substitute for, the expertise and judgment of your physician, pharmacist or other healthcare professional. It should not be construed to indicate that the use of the drug is safe, appropriate, or effective for you. Consult your healthcare professional before taking this drug.

This medicine is a white, round, tablet imprinted with 2.

USES: Nitroglycerin relaxes blood vessels allowing more blood to flow through. This reduces the workload on the heart and improves blood flow to the heart. Sublingual nitroglycerin tablets act quickly to relieve chest pain (angina).

HOW TO USE: At the first sign of chest pain, sit down and place one tablet under the tongue or between your cheek and gum allowing it to dissolve. The drug is absorbed directly through the lining of the mouth. Do not chew or swallow the tablet. Do not eat, drink or smoke while the nitroglycerin is in your mouth. Effects should begin in 1 to 3 minutes. If after 5 minutes there is no relief of chest pain, take another tablet. If there is no relief after taking three tablets, call your doctor immediately or go to a hospital emergency room. Carry this medication with you at all times.

SIDE EFFECTS: Headache, dizziness, flushing, rapid heartbeat or restlessness may occur as your body adjusts to the medication. If they persist or become bothersome, inform your doctor. To prevent dizziness and lightheadedness when rising from a seated or lying position, get up slowly. Notify your doctor if you experience blurred vision, dry mouth, skin rash or nausea. Headache is often a sign the medication is working. Treat headaches with an aspirin or non-aspirin pain reliever as recommended by your doctor. If the headaches continue or become severe, notify your doctor. In the unlikely event you have an allergic reaction to this drug, seek medical attention immediately. Symptoms of an allergic reaction include: rash, itching, swelling, dizziness, trouble breathing. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

DRUG INTERACTIONS: This drug is not recommended for use with sildenafil. Ask your doctor or pharmacist for more details. Tell your doctor of all medications you may use including prescription and nonprescription drugs and especially: drugs for high blood pressure, certain migraine drugs (ergot alkaloids), aspirin. Do not start or stop any medicine without doctor or pharmacist approval.